

**DIN:**

**ELECTROLYTE-F-CALF HE**

**WATER SOLUBLE SUPPLEMENTARY NUTRIENT ELECTROLYTE POWDER FOR  
ORAL ADMINISTRATION IN CALVES**

**VETERINARY USE ONLY**

**NET CONTENTS: 184 g & 3.7 Kg**

**ACTIVE INGREDIENT**

**Each 184 g Pouch Contains**

Dextrose	152.000 g
Sodium Acetate Anhydrous	13.125 g
Glycine	6.006 g
Sodium Chloride	4.675 g
Dipotassium Phosphate	1.742 g
Potassium Chloride	1.491 g
Citric Acid Anhydrous	1.000 g

**When Reconstituted as directed the  
solution contains approximately:**

Na <sup>+</sup>	120 mEq / L
K <sup>+</sup>	20 mEq / L
H <sup>+</sup>	12.8 mEq / L
Cl <sup>-</sup>	50 mEq / L
HPO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	15 mEq / L
Citrate	7.8 mEq / L
Acetate	80 mEq / L
Dextrose	422 mMol / L
Glycine	40 mMol / L
Total Osmolarity	767.6 mOsm / L

Can-Vet Animal Health Supplies Ltd.  
4-61 Malcolm Rd.  
Guelph, ON  
N1K 1A7

Lot / Exp

**INDICATIONS:** As an aid in the prevention and treatment of dehydration, acidosis, and electrolyte imbalance in calves with diarrhea. This solution is designed for maximal absorption following oral administration.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION:** Dissolve the contents of one pouch (184 g) in 2 L of warm water (37°C) and administer the entire amount by a nursing bottle or stomach tube. Administer two times a day as necessary until the symptoms disappear.

The solution does not interfere with milk digestion and can be given to suckling and milk fed calves. Milk deprivation is unnecessary if the calf is willing to drink.

Calves that refuse milk should be given electrolytes only. As a calf recovers, re-introduce milk and gradually decrease the amount of electrolyte solution. Shake well before using. Discard solution if not used within 24 hours.

**CONTRAINDICATIONS:** Do not use in cases of upper gastro-intestinal obstruction or in debilitated animals.

**CAUTION:** If improvement is not seen within two or three days, consult a veterinarian.

**STORAGE:** Protect from light and humidity. Store between 15 – 30°C (59 - 86°F).

**DIN:**

## **ELECTROLYTE-F-CALF HE**

**POUDRE HYDROSOLUBLE D'ELECTROLYTE NUTRITIVE SUPPLEMENTAIRE SOLUBLE  
POUR L'ADMINISTRATION ORALE CHEZ LES VEAUX**

**POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT**

**CONTENU NET: 184 g & 3.7 Kg**

**INGRÉDIENTS ACTIFS**

**Chaque 184g Renferme**

Dextrose	152.000 g
Acétate de Sodium Anhydrouse	13.125 g
Glycine	6.006 g
Chlorure de Sodium	4.675 g
Phosphate de Dipotassium	1.742 g
Chlorure de Potassium	1.491 g
Citrique Acidé Anhydrouse	1.000 g

**Une fois reconstituée tel qu'indiqué la  
solution fournie approximativement:**

Na <sup>+</sup>	120 mEq / L
K <sup>+</sup>	20 mEq / L
H <sup>+</sup>	12.8 mEq / L
Cl <sup>-</sup>	50 mEq / L
HPO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	15 mEq / L
Citrate	7.8 mEq / L
Acétate	80 mEq / L
Dextrose	422 mMol / L
Glycine	40 mMol / L

Can-Vet Animal Health Supplies Ltd.

4-61 Malcolm Rd.

Guelph, ON

N1K 1A7

Lot / Exp

**INDICATIONS:** Pour aider à la prévention et au traitement de la déshydratation, de l'acidose et des déséquilibres électrolytiques chez les veaux diarrhéiques. Cette solution est conçue pour la maximale absorption administration orale suivante.

**POSOLOGIE ET ADMINISTRATION:** Dissoudre le contenu d'un sachet (184 g) dans 2 L d'eau tiède (37°C) et administrer la totalité du volume à l'aide d'un biberon ou d'une sonde stomacale. Administrer deux fois par jour, au besoin, jusqu'à la disparition des symptômes.

La solution n'interfère pas avec la digestion du lait et peut être administrée aux veaux qui allaitent ou qui sont alimentés au lait en bouteille. La privation de lait n'est pas nécessaire si le veau manifeste le désir de boire.

Les veaux refusant le lait devraient être nourris exclusivement aux électrolytes. Au rétablissement d'un veau, réintroduire le lait en diminuant graduellement le volume de solution d'électrolytes.

Bien agiter avant l'usage. Jeter la solution si elle n'est pas utilisée dans les prochaines 24 heures.

**CONTRE-INDICATIONS:** Ne pas utiliser chez les veaux souffrant d'obstruction gastro-intestinale ou gravement malades.

**PRÉCAUTION:** Si aucune amélioration n'est notée dans deux ou trois jours, veuillez consulter un vétérinaire.

**ENTREPOSAGE:** Protéger de la lumière et de l'humidité. Entreposer à une température entre 15 – 30°C (59 – 86°F).