

ELECTROLYTE CONCENTRATE

ELECTROLYTES CONCENTRATED AQUEOUS SOLUTION ÉLECTROLYTES EN SOLUTION AQUEUSE CONCENTRÉE

DIN: 02207877

FOR ORAL USE ONLY

INDICATIONS:

As an aid for correcting fluid and electrolyte imbalance in swine and cattle.

PREPARATION:

Mix 30 mL with 470 mL of water. This provides the following quantities of electrolytes:

Na⁺: 139.0 mEq / L Mg²⁺: 3.0 mEq / L
 K⁺: 10.0 mEq / L Ca²⁺: 4.0 mEq / L
 HCO₃⁻: 55 mEq / L Cl⁻: 101.0 mEq / L
 (eq. 55 mEq / L bicarbonate)

Dextrose: 160.9 mMol / L.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Administer the prepared solution orally by stomach tube, dose syringe or as a drench at the following doses given up to 3 times daily depending on the severity of the condition, for 3 – 4 days.

Calves: 0.5 to 1.5 L per animal

Mature Cattle: 1 to 5 L per animal

Suckling Pigs: 10 to 20 mL per animal

Older Pigs: 250 to 500 mL per animal

Horses: 0.5 - 1.0 L per animal

CONTRAINDICATIONS: Do not use in cases of upper gastrointestinal obstruction or in moribund animals.

STORAGE: Store in a cool, dry place below 23°C

WARNING: KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

Manufactured By:

**Medprodex Inc. 4-61 Malcolm Rd.
 Guelph, ON N1K 1A7**



ACTIVE INGREDIENTS

Each 30 mL Contains:

Sodium Chloride	2.76 g
Calcium Chloride Dihydrate	150 mg
Magnesium Chloride Hexahydrate	150 mg
Sodium Acetate Trihydrate	3.05 g
Potassium Acetate	500 mg
Dextrose Monohydrate	15.0 g

INGRÉDIENTS ACTIFS

Chaque 30 mL Renferme:

Chlorure de Sodium	2,76 g
Chlorure de calcium dihydraté	150 mg
Chlorure de magnésium hexahydraté	150 mg
Acétate de Sodium Trihydraté	3,05 g
Acétate de Potassium	500 mg
Dextrose Monohydraté	15,0 g

NET CONTENTS / CONTENU NET: 4 L

POUR ADMINISTRATION ORALE SEULEMENT

INDICATIONS:

Pour aider à corriger le déséquilibre hydro-électrolytique chez les porcs et les bovins.

MODE DE PRÉPARATION:

Mélanger 30 mL avec 470 mL d'eau. Ceci procure les quantités d'électrolytes suivantes

Na⁺: 139.0 mEq / L Mg²⁺: 3.0 mEq / L
 K⁺: 10.0 mEq / L Ca²⁺: 4.0 mEq / L
 HCO₃⁻: 55 mEq / L Cl⁻: 101.0 mEq / L
 (eq. 55 mEq / L bicarbonate)

Dextrose: 160.9 mMol / L.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION:

Administer the solution prepared by oral route by means of a stomach tube, syringe or as a drench at the following doses given up to 3 times daily depending on the severity of the condition, for 3 – 4 days.

Veaux: 0.5 à 1.5 L par animal

Bovins adultes: 1 à 5 L par animal

Porcelets allaités: 10 à 20 mL par animal

Porcs adultes: 250 à 500 mL par animal.

Chevaux: 0.5 à 1.0 L par animal

CONTRAINDICATIONS: Ne pas utiliser ce produit dans les cas d'obstructions gastrointestinales supérieures ou pour les animaux moribonds.

ENTREPOSAGE: Conserver dans un endroit sec et frais en dessous de 23°C.

MISE EN GARDE: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS